

TEMA N. 3



1. Durante la somministrazione di una sacca di concentrato eritrocitario un residente manifesta brivido, febbre, rush cutaneo e dispnea. Quali sono gli interventi da mettere in atto?

- a) Rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se confermata la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- b) Interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare la sacca ed il set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- c) Avvisare il medico, rallentare la somministrazione, impostare terapia cortisonica, inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
- d) Interrompere la somministrazione, avvisare il medico, rimuovere l'accesso venoso ed applicare ghiaccio sulla sede di iniezione, inviare la sacca al centro trasfusionale.

2. Un residente affetto da scompenso cardiaco è in terapia con furosemide, digossina e potassio canreonato. Il residente appare confuso e riferisce nausea, alterazioni del visus, cefalea ed astenia. Il tracciato ECG mostra blocco atrio-ventricolare di primo grado. L'infermiere a quale situazione clinica ricondurrà tali dati?

- a) Intossicazione digitalica
- b) Iperpotassiemia
- c) Disidratazione
- d) Edema polmonare

3. Un residente affetto da demenza di livello moderato ha difficoltà a bere e tossisce all'assunzione dei liquidi. Quali indicazioni darà l'infermiere?

- a) Capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare bicchiere adatto riempito in minima parte
- b) Capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, può utilizzare una cannuccia
- c) Capo rivolto in avanti, addensare liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adatto riempito almeno tre quarti
- d) Capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca somministrando piccole quantità di liquido

4. A quali categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine

- a) Diuretici
- b) Miocardiotonici
- c) Sedativi
- d) Antiaritmici

5. In un residente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene:

- a) Con le sole pacche interscapolari
- b) Con la sola manovra di Heimlich
- c) Incentivando la persona a tossire controllandola
- d) Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich

RK J F EF

6. Le fiale di Sodio Bicarbonato da 10 ml hanno la seguente concentrazione: 1mEq/ml. Definire il numero di fiale necessarie per somministrare 25mEq

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $1\frac{1}{2}$
- c) 2
- d) $2\frac{1}{2}$

7. Il figlio di una residente chiede se possono applicare le spondine al letto della madre, perché teme che di notte possa cadere. Un infermiere risponderà che le spondine:

- a) Non riducono le cadute ed i traumatismi; è più opportuno posizionare il letto ad altezza ridotta
- b) Riducono le cadute e i traumatismi: è necessario il consenso alla procedura, firmando l'apposito modulo
- c) Si devono sempre mettere nelle persone anziane in assenza di un familiare
- d) Riducono le cadute e tranquillizzano il residente pertanto è di prassi l'utilizzo durante la notte

8. I principali parametri utilizzati per classificare le severità della malnutrizione sono:

- a) Calo ponderale in % su peso abituale, BMI, albumina, prealbumina, transferrina
- b) Presenza del ridotto introito alimentare, BMI, albumina, prealbumina, immunoglobuline
- c) Calo ponderale in % su peso abituale, ridotto introito alimentare, proteine totali, transferrina
- d) Trend di perdita di peso, BMI, incapacità di alimentarsi, proteine totali, immunoglobuline

9. Il medico necroscopo ha il compito di:

- a) Autorizzare il seppellimento
- b) Eseguire accertamenti sul cadavere per conto dell'Autorità Giudiziaria
- c) Effettuare il sopralluogo
- d) Accertare la morte

10. I "neurolettici" sono più comunemente chiamati:

- a) Tranquillanti
- b) Ipnotici
- c) Antipsicotici
- d) Antidepressivi

11. Quali sono gli effetti di una marcata ipopotassiemia?

- a) Astenia, tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare
- b) Astenia, blocco atrioventricolare, asistolia
- c) Cefalea, confusione, asistolia
- d) Cefalea, confusione, fibrillazione ventricolare

12. Indicare quale tra le seguenti associazioni studia le diagnosi infermieristiche:

- a) ICN
- b) CDC
- c) NANDA
- d) OMS

RK

A

A

EP

13. In un residente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene:
- a) Con le sole pacche interscapolari
 - b) Con la sola manovra di Heimlich
 - c) Incentivando la persona a tossire controllandola
 - d) Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich
14. Il dolore neuropatico può essere?
- a) Urente
 - b) Associato a formicolio
 - c) Cronico-parossistico
 - d) Tutte
15. Nel calcolo del MAPO quale di questi fattori non viene preso in considerazione?
- a) formazione degli operatori
 - b) peso mobilizzato
 - c) il tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti
 - d) le attrezzature in dotazione
16. Quale tra le seguenti non è una caratteristica dei contenitori per lo smaltimento di aghi e taglienti ?
- a) essere a tenuta stagna
 - b) essere resistenti agli urti
 - c) avere un sistema di chiusura irreversibile
 - d) essere almeno in parte trasparenti
17. I dati riferiti allo stato di salute:
- a) possono essere diffusi laddove vi sia l'autorizzazione del titolare del trattamento
 - b) possono essere diffusi soltanto se l'interessato non si oppone
 - c) possono sempre essere condivisi con tutto il personale
 - d) non devono mai essere diffusi
18. Qual è il principale riferimento normativo in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori ?
- a) il contratto collettivo nazionale di lavoro e per il trentino anche il contratto provinciale di lavoro
 - b) il codice civile
 - c) il decreto legislativo n° 626/1994
 - d) il decreto legislativo n° 81/2008

Ric

EP

g

2. Parli della scelta e utilizzo delle contenzioni.

Lined area for writing the answer.

RK → EP J

